

POSOLOGIA RECOMENDADA
A.- ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS

• Herpes zoster	Esquema I: 1 Unidad (U) c/24 hrs. Posteriormente, 1 U c/48 hrs. Esquema II: 1U c/48 hrs.	2-3 U 5 U 5-7 U
• VHS Virus Herpes simplex tipos 1 y 2, Herpes genital	1 U c/8 días, posteriormente 1 U c/15 días 1 U c/8 días,	5 U 5 U 3 a 5 meses
• Queratitis herpética en fase aguda, Gingivostomatitis herpética y demás afecciones orales	1 U c/48 hrs.	2-5 U
• Queratitis herpética recidivante	1 U c/8 días	5 U
• Varicela grave	1 U c/24 hrs. 1 U c/48 hrs.	2 U 3 U
• Sarampión grave	1 U c/24 hrs. 1 U c/48 hrs.	5 U 5 U
• Paperas	1 U c/24 hrs. 1 U c/48 hrs.	2-3 U 2-3 U
• Papilomatosis laríngea	1 U c/72 hrs. 1 U c/8 días	3 U 7-15 U
• Neuritis posherpética	1 U c/24 hrs. 2 U c/semana 1 U c/semana	5 U 8 U 4-12 U
• Mononucleosis infecciosa (fase aguda) (fase crónica)	1 U c/48 hrs. 1 U c/48 hrs.	2-3 U 5 U Repetir si es necesario
• Citomegalovirus (CMV)	1 U c/4 días	5 U
• Síndrome de fatiga crónica	1 U c/8 días	15 a 20 U
• Hepatitis viral A	1 U c/48 hrs.	10 a 15 U
• B y/o C	1 U c/4 días	Posterior a valoración médica, 1 por semana
• Hepatitis fulminante	1 U c/4 hrs.	30 U
• Dengue	1 U c/48 hrs. hasta remisión del cuadro	
• Verrugas vulgares multitratadas	1 U c/8 días	5-10 U
• Tuberculosis	1 U c/8 días	10 U
• Sinusitis crónica	1 U c/8 días	5-10 U
• Infecciones de VSR de repetición	1 U c/8 días	5-10 U
• Infecciones urinarias de difícil manejo	1 U c/4 días	5-10 U
• Síndrome diarreico de difícil manejo	1 U c/8 días	5 U
• Sepsis	2 U al inicio y 1 U c/12 hrs.	20 U
• DIABETES: Pie diabético	1 U c/día por 5 días. Posterior a valoración médica,	1 U por semana
Cetoacidosis	1 U c/4 días hasta remisión del cuadro y posterior a valoración médica,	1 U por semana
• Osteomielitis crónica	1 U c/4 días 1 U c/8 días	10-15 U 5 U
• Candidosis	1 U c/4 días	5 U

• Otras micosis oportunistas	1 U c/8 días	5-10 U
• Micosis profunda	1 U c/8 días	5-10 U
• SIDA Seropositivo asintomático	1 U c/8 días	Indefinido
• Cuadros activos por agentes oportunistas	1 U c/24 hrs. hasta remisión del cuadro	
• Profiláctico	1 U c/8 días	Indefinido
• Leishmaniasis	1 U c/6 días	20-30 U
• Toxoplasmosis	1 U c/8 días	15 U
• Anemia hipocrómica	3 por semana por 3 días	9 U
	1 por semana por 2 meses	8-10 U

B.- ENFERMEDADES CON PERDIDA DE LA REGULACION DE LA RESPUESTA INMUNE

• Asma bronquial:		
• Esquema I	1 U c/8 días	10 U
• Esquema II	1 U c/24 hrs. 1 U c/8 días	5 U y continuar con: 5 U
• Crisis asmática	1 U c/48 hrs. hasta salir de la crisis	Valorar y continuar con esquema I
• Psoriasis multitratada	1 U c/8 días	20 U y valorar continuidad
• Inmunodeficiencias de la RIC	1 U c/8 días	10-20 U
• Dermatitis Atópica (por uso crónico de esteroides)	1 U c/24 hrs. 3 U c/semana por 2 semanas 2 U c/semana por 4 meses	5 U Disminuir dosis conforme a respuesta del paciente pudiendo llegar hasta 8 meses
• Esclerosis Sistémica progresiva	1 U c/24 hrs. 3 U por semana	5 U Posterior a valoración médica, 1U por semana
• Lupus Eritematoso Sistémico o Artritis reumatoride	1 U c/8 días	indefinido

C.- NEOPLASIAS

• En pacientes con quimio y radioterapia	1 U un día antes de iniciar cada sesión de quimio hasta el término de los tratamientos
• Ca. Próstata, CaCU, Ca. Mama, Ca. Pulmonar Sin/metástasis:	2 U c/semana por 1 mes y continuar 1 por semana indefinidamente
• Con metástasis y/o síndrome neoplásico	1 U c/24 hrs. Por 5 días, continuar 3 por semana por 1 mes y después 2 por sem. indefinidamente
• Pacientes prequirúrgicos	3 U pre-cirugía y 3 U post-cirugía
• Cirugía de alto riesgo (pacientes con fracturas expuestas, pacientes infectados, inmunosuprimidos)	3 U pre-cirugía y 3 U post-cirugía 1U c/24 hrs. hasta 5 U totales
• Profilaxis en pacientes inmunocomprometidos (cáncer, trasplantados, personas sometidas a tratamiento inmunosupresor)	1 U c/8 días por tiempo indefinido o hasta que se restablezca su sistema inmune
• Leucemia aguda linfocítica mieloblástica	3 U por semana y disminuir la dosis por semana conforme se recupere el paciente
• Linfoma	3 U por semana por 1 mes y disminuir conforme responda el paciente.

Es importante mencionar que el **Facimmune**® (Factor de Transferencia, FT) es una terapia complementaria al tratamiento convencional u ortodoxo. La experiencia del médico en el manejo de las diferentes patologías aquí descritas, será un aspecto vital para el análisis de las dosis-respuesta que observe en sus pacientes, de tal forma que los esquemas anteriores propuestos podrán ser modificados a juicio del clínico.